

ترکیب: دانش شما + ممتوای بی نظیر تدریس ما

تمرین و پاسفنامه

درسنامه آپدیت

کوئیز و آزمون

«آسان و روان، حرفه‌ای و متمایز تدریس کنید.»





«چاپ تمام رنگی جزوه اختصاصی شما برابر هزینه فایل»

(مذف هزینه چاپ)



کلاس ایده‌ال:



سرعت آموزش خود را دو برابر کنید!

(رفع مشکل کمبود وقت برای تدریس کامل کتاب)



پیشنهادات ویژه چاپ:

چاپ کلاسی: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تخفیف برای سفارش ۱۰ جلد یا بیشتر.

چاپ تک جلد: بدون هزینه اضافه، معادل هزینه فایل در آدرستان تحویل می‌شود.


(یک جلد هدیه نسخه خودآموز به مدرس در سفارشات ۲۰ جلد یا بیشتر)

(نسخه تدریس در دست شاگردان)

پلد نمونه از نتایج درفشان برفی از همکاران مجموعه درس آموزه: **(خرداد و تابستان ۱۴۰۴)**

- از یک جمع چند نفره خصوصی، تمام افراد نمره ۱۹/۵ یا ۱۹/۷۵ کسب کردند؛ (حسابان دوازدهم نهایی)
- از یک گروه ۲۷ نفره در آموزشگاه، چند نفر ۲۰ و اکثراً نمره بالاتر از ۱۵ نهایی و از یک گروه ۱۱ نفره، پنج نفر نمره ۱۹/۵ یا بالاتر و هیچ کدام کمتر از ۱۸ نبودند؛ (دوازدهم انسانی نهایی)
- از جمع شاگردان فقط یکی از اساتید، کسب ۱۰ رتبه دو رقمی منطقه ۲ در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی. (کنکور ۱۴۰۴)
- کسب درصد ریاضی فقط ۳ درصد کمتر از رتبه یک کنکور تجربی. (کنکور ۱۴۰۲)

محتوای تشریحی و نهایی



(خدمات منحصر به فرد گروه درس آموز)

اطلاعات شخصی مدرس، لوگو و تبلیغات شخصی یا مدرسه یا آموزشگاه، روش‌های ارتباطی با شما و ... روی جلد و در تمام صفحات درسنامه، به زیباترین شکل ممکن درج می‌شود.

و

در کل مجموعه، هیچ نام یا نشانی از گروه ما درج نمی‌شود.



۱

تابع

۲

انواع جایجایی‌های نمودار و رسم، توابع چند جمله‌ای و رسم، بررسی یکنوایی توابع، تقسیم چندجمله‌ای و بخش‌پذیری

۲

مثلثات

۳۱

توابع متناوب، نمودار و تعیین دوره تناوب، بیان تابع تانژانت و نمودار آن، معادلات مثلثاتی و بسط نسبت‌ها

۳

بی‌نهایت در حد

۵۵

دامنه‌ی تابع و همسایگی، حدهای نامتناهی، حد تابع در بی‌نهایت، حد نامتناهی در بی‌نهایت، مجانب‌های قائم و افقی

۴

مشتق تابع (۱)

۸۲

مفهوم خط مماس، شیب مماس و تعریف مشتق، معادله‌ی مماس بر نمودار، بررسی نقش پیوستگی در بررسی مشتق، مشتق-های یک‌طرفه

۵

مشتق تابع (۲)

۹۸

روش مشتق‌گیری و تابع مشتق، مشتق-گیری از توابع مرکب، انواع آهنگ تغییرات تابع و برخی کاربردها

۶

کاربرد مشتق (۱)

۱۲۳

تشخیص صعودی یا نزولی بودن تابع، اکسترمم‌های نسبی تابع، اکسترمم‌های مطلق تابع و مسائل بهینه‌سازی

۷

کاربرد مشتق (۲)

۱۴۶

تعیین جهت تقعر نمودار و تعیین نقطه-ی عطف نمودار، کاربرد مشتق در روش کلی رسم نمودار، آشنایی با تابع هموگرافیک



آموزش:

حسابان دوازدهم



تابع

صفحه	فهرست
۳	تغییرات افقی نمودار
۸	تغییرات عمودی نمودار
۱۷	توابع مندمله‌ای
۲۰	توابع یکنوا
۲۶	تقسیم مندمله‌ای و بخش‌پذیری



انتقال افقی و عمودی

دو حالت انتقال نمودار به صورت زیر یادآوری می‌شوند.

انتقال افقی:

وقتی نمودار $y = f(x)$ را داشته باشیم، برای $a > 0$:

■ در رسم نمودار تابع $y = f(x+a)$:

نمودار $y = f(x)$ به اندازه a به صورت **افقی به سمت چپ** منتقل می‌شود.

■ در رسم نمودار $y = f(x-a)$:

نمودار $y = f(x)$ به اندازه a به صورت **افقی به سمت راست** منتقل می‌شود.

دلیل:

اگر نقطه (x_0, y_0) روی نمودار $y = f(x)$ باشد: $f(x_0) = y_0$ ، آنگاه انتقال یافته‌ی نقطه به اندازه a به چپ، یعنی:

$(x_0 - a, y_0)$ روی نمودار $y = f(x+a)$ قرار دارد:


$$y = f(x+a) \xrightarrow{x=x_0-a} f((x_0-a)+a) = f(x_0) = y_0$$

به صورت مشابه:

انتقال یافته‌ی نقطه به اندازه a به راست، یعنی: $(x_0 + a, y_0)$ روی نمودار $y = f(x-a)$ قرار دارد.


برای نمونه:

الف) نمودار تابع $f(x) = |x-2|$ را با استفاده از انتقال نمودار $y = |x|$ رسم می‌کنیم: (انتقال به راست)




ب) نمودار تابع $g(x) = \sqrt{x+3}$ توسط نمودار $y = \sqrt{x}$ رسم می‌شود: (انتقال به چپ)

نمودار \sqrt{x} توسط نقاط $(0,0)$ و $(1,1)$ و $(4,2)$ رسم شده است.






نهایی؛ خرداد ۱۴۰۱



نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است.
نمودار تابع $g(x) = f(x-1)$ را رسم کرده و دامنه‌ی آن را تعیین کنید.

پاسخ



مثال: (از کتاب) نمودار تابع $y = \log_p x$ به صورت مقابل رسم شده است.

نمودار تابع $y = \log_p(x+2)$ را با انتقال رسم کنید.

پاسخ

مثال: نمودار تابع $y = (x+2)^2$ را توسط انتقال در بازه‌ی $[-3, 0]$ رسم کرده و برد آن را معلوم کنید.

پاسخ

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۰

نمودار تابع $y = \cos(x - \frac{\pi}{4})$ را به کمک نمودار $y = \cos x$ در بازه‌ی $[0, 2\pi]$ رسم کنید.

پاسخ



دو حالت ساده در تبدیل عمودی نمودار:

انتقال عمودی:

وقتی نمودار f را داشته باشیم، برای رسم نمودار تابع $y = f(x) + k$ ، طول نقاط ثابت مانده و فقط عرض آن‌ها را به اندازه k در جهت عمودی انتقال می‌دهیم. به طور دقیق‌تر:

- اگر k **مثبت** باشد، نمودار به اندازه k به **بالا** منتقل می‌شود.
- اگر k **منفی** باشد، نمودار به اندازه k به **پایین** منتقل می‌شود.


دلیل:

اگر نقطه‌ی (x_0, y_0) روی نمودار $y = f(x)$ باشد: $f(x_0) = y_0$ ، آنگاه انتقال یافته‌ی عمودی نقطه به اندازه k ، یعنی: $(x_0, y_0 + k)$ روی نمودار $y = f(x) + k$ قرار دارد:


$$y = f(x) + k \xrightarrow{x=x_0} f(x_0) + k = y_0 + k$$

برای نمونه:

الف) نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت زیر داده شده است:




در رسم نمودار $y = f(x) - 1$ ، عرض هر نقطه یک واحد کم می‌شود: دامنه و برد تابع جدید:




$$D = [0, 2] \quad \text{و} \quad R = [-1, 1]$$

ب) نمودار تابع $g(x) = \sqrt{x-1} + 1$ در دو مرحله توسط نمودار $y = \sqrt{x}$ رسم می‌شود: (انتقال به راست و سپس به بالا)



مثال: نمودار تابع $f(x) = |x-2| - 2$ را با تغییرات مناسب نمودار $y = |x|$ رسم کرده و برد آن را مشخص کنید.





مثال: (مشابه کتاب) نمودار تابع $f(x) = 2^x$ به صورت مقابل رسم شده است.

نمودار تابع $y = 2^{x-2} + 1$ را با انتقال رسم کنید.


پاسخ

(بررسی دقیق تأثیر انتقال نمودار بر دامنه و برد تابع، در بخش بعد انجام شده است.)



پاسخ دهید (۱) ?




۱- با استفاده از نمودار تابع $y = f(x)$ در شکل روبه‌رو، نمودار $y = f(x-1) - 1$ را رسم کنید.



۲- نمودار توابع $f(x) = \cos x + 2$ و $g(x) = \sin(x - \frac{\pi}{2})$ را رسم کنید.


مکتب کتاب:

۱- در زیر، نمودار توابع $y = 2^x$ ، $y = \log_2 x$ و $y = \cos x$ رسم شده‌اند. نمودار توابع $y = 2^{x-1} + 2$ ، $y = \log_2(x+2)$ و $y = \cos(x + \frac{\pi}{2})$ را به کمک انتقال رسم کنید.



چالش (ویژه علاقمندان)

نمودار تابع f به صورت روبه‌رو است. نمودار تابع $y = f(1+|x|)$ را رسم کنید.



۲ انبساط و انقباض نمودار

روشی دیگر در تبدیل عمودی نمودار:

انبساط و انقباض عمودی:

وقتی نمودار یک تابع f را داشته باشیم، برای رسم نمودار تابع $y = kf(x)$ ، طول نقاط نمودار ثابت مانده و فقط عرض آن‌ها در عدد k ضرب می‌شود. به طور دقیق‌تر:

- اگر $k > 1$ باشد، اندازه‌ها بزرگ‌تر شده و نمودار به صورت عمودی گسترده‌تر می‌شود.
(نمودار انبساط می‌یابد.)
- اگر $0 < k < 1$ باشد، اندازه‌ها کوچک‌تر شده و نمودار به صورت عمودی جمع‌تر می‌شود.
(نمودار انقباض می‌یابد.)


دلیل:

اگر نقطه‌ی (x_0, y_0) روی نمودار $y = f(x)$ باشد: $f(x_0) = y_0$ ، آنگاه نقطه‌ی (x_0, ky_0) روی نمودار $y = kf(x)$ قرار دارد. زیرا:

$$y = kf(x) \xrightarrow{x=x_0} kf(x_0) = ky_0$$

برای نمونه:

هنگام رسم نمودار $y = 2\sqrt{x}$ ، عرض تمام نقاط نمودار $y = \sqrt{x}$ در عدد ۲ ضرب می‌شود:



توجه کنید:


نقطه‌ی $(1, 1)$ به $(1, 2)$ ، نقطه‌ی $(1, 2)$ به $(1, 4)$ ، نقطه‌ی $(4, 2)$ به $(4, 4)$ و البته نقطه‌ی $(0, 0)$ به همان $(0, 0)$ تبدیل شده و نمودار انقباض عمودی یافته است.

مثال: نمودار تابع $g(x) = 2x^2 - 1$ را با تغییرات مناسب نمودار $y = x^2$ رسم کنید.

پاسخ


توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



مثال: نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع $g(x) = 2f(x-1)$ را رسم کرده و دامنه و برد آن را تعیین کنید.

پاسخ



مثال: با رسم نمودار $y = \sqrt{x}$ ، نمودار تابع $y = -2\sqrt{x} + 1$ را رسم کنید.

پاسخ

انبساط و انقباض معکوس:

چنان که در نمونه‌ی قبل می‌بینید، در رسم $y = kf(x)$ ، اگر k منفی باشد، نمودار f علاوه بر انبساط یا انقباض عمودی، نسبت به محور طول بازتاب هم می‌یابد.

حالت ویژه: (مهم)

در رسم نمودار $y = -f(x)$ ، چون عرض‌ها قرینه می‌شوند:

نمودار تابع f نسبت به محور طول قرینه می‌شود.

مثال: مساحت محدود به نمودار $y = -|x| + 2$ و محور طول‌ها را بیابید.

پاسخ

**توجه کنید:**

در تغییرات عمودی نمودار:

دامنه‌ی تابع ثابت مانده و معمولاً برد تغییر می‌کند.**توضیح بیشتر:**اگر برد تابع $f(x)$ به صورت $[y_1, y_2]$ باشد، آنگاه:

برد توابع $f(x) - k$ و $f(x) + k$ به ترتیب $[y_1 - k, y_2 - k]$ و $[y_1 + k, y_2 + k]$ هستند و برد $kf(x)$ برابر $[ky_1, ky_2]$ است. (اگر k منفی باشد: برد $[ky_2, ky_1]$ است.)

برای نمونه:

اگر برد تابع f بازه‌ی $[-4, 1]$ باشد، برد تابع $y = -2f(-\frac{x}{2}) + 1$ برابر $[-1, 9]$ است، زیرا:

$$[-4, 1] \xrightarrow{-2f(-\frac{x}{2})} [-2(1), -2(-4)] = [-2, 8] \xrightarrow{-2f(-\frac{x}{2})+1} [-2+1, 8+1] = [-1, 9]$$

تبدیل مهم دیگری از نمودار توابع به صورت زیر است:

انبساط و انقباض افقی:وقتی نمودار یک تابع f را داشته باشیم، برای رسم نمودار تابع $y = f(kx)$:

- ❖ نقاطی با طول و عرض مشخص از نمودار f انتخاب می‌کنیم.
- ❖ طول این نقاط بر k تقسیم شده و عرض نقطه ثابت می‌ماند.

بویژه:

- اگر $0 < k < 1$ باشد، نمودار به صورت افقی گسترده‌تر می‌شود، (انبساط می‌یابد).
- اگر $k > 1$ باشد، نمودار به صورت افقی جمع‌تر می‌شود، (انقباض می‌یابد).

دلیل:اگر نقطه‌ی (x_0, y_0) روی نمودار $y = f(x)$ باشد: $f(x_0) = y_0$ ، نقطه‌ی $(\frac{x_0}{k}, y_0)$ روی نمودار $y = f(kx)$ قرار دارد:

$$y = f(kx) \xrightarrow{x=\frac{x_0}{k}} f(k(\frac{x_0}{k})) = f(x_0) = y_0$$

مثال: نمودار تابع $g(x) = |2x|$ را با تغییر مناسب نمودار $f(x) = |x|$ رسم کنید.


پاسخ



مثال: درستی یا نادرستی هر مورد را تعیین کنید:

الف) اگر $k > 1$ باشد، نمودار $y = f(kx)$ از انبساط افقی نمودار $y = f(x)$ در راستای محور x ها به دست می‌آید.

ب) اگر نقطه‌ی $(-3, 1)$ روی نمودار f باشد، نقطه‌ی $(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ روی نمودار تابع $y = -2f(2x)$ است.



مثال: نمودار تابع f به شکل مقابل است:


الف) نمودار $y = f(\frac{x}{2})$ را رسم کنید.

ب) دامنه و برد تابع جدید را مشخص کنید.


پاسخ

مثال: نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است.

نمودار تابع $g(x) = f(2x) - 1$ را رسم کرده و دامنه و برد آن را تعیین کنید.




پاسخ



مثال: نمودار تابع $h(x) = |\frac{x}{2}| - 1$ را با تغییرات مناسب نمودار $f(x) = |x|$ رسم کنید.


توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



انبساط و انقباض معکوس:

در رسم $y = f(kx)$ ، اگر k منفی باشد، نمودار ضمن انبساط یا انقباض افقی، نسبت به محور عرض بازتاب هم می‌یابد. برای نمونه:



حالت ویژه: (مهم)

اگر $k = -1$ باشد، یعنی در رسم نمودار $y = f(-x)$:

نمودار $f(x)$ نسبت به محور عرض‌ها قرینه شود.

بعلاوه: (تکلیف مهم)

در مواردی که ضابطه‌ی تابع چندین تغییر گوناگون داشته، اگر x قرینه شده یا ضرب گرفته، تغییرات روی آن را در آخرین گام انجام دهید. برای نمونه:

- برای رسم $f(2x-1)$ چنین عمل کنید:


$$f(x) \longrightarrow f(x-1) \longrightarrow f(2x-1)$$

ابتدا یک واحد به راست و سپس تقسیم طول نقاط در ۲

- برای رسم $f(-2x+1)$ چنین عمل کنید:

$$f(x) \longrightarrow f(x+1) \longrightarrow f(2x+1) \longrightarrow f(-2x+1)$$

ابتدا یک واحد به چپ، سپس انقباض افقی با ضرب ۲ و در پایان قرینه نسبت به محور عرض




مثال: نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است.


نمودار تابع $g(x) = f(3-x)$ را رسم کرده و دامنه‌ی آن را تعیین کنید.




پاسخ ✓



مثال: (مشابه کتاب) نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت روبه‌رو داده شده؛ نمودار تابع $y = f\left(-\frac{x}{2}\right)$ را رسم کرده و دامنه و برد آن را تعیین کنید.




پاسخ ✓





نهایی؛ خرداد ۱۴۰۳

نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت روبه‌رو داده شده؛ نمودار تابع $y = -f(2x-1)$ را رسم کرده، دامنه و برد آن را تعیین کنید.




پاسخ ✓





مثال: (مشابه کتاب) نمودار مقابل فقط توسط دو عمل انتقال و قرینه سازی از نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ به دست آمده است. ضابطه‌ی تابع مربوطه را بنویسید.

پاسخ



توجه کنید:

در تبدیل‌های افقی نمودار، همیشه:

برد تابع ثابت مانده و فقط دامنه ممکن است تغییر کند.

بیان دقیق‌تر:

- اگر دامنه‌ی تابع $f(x)$ به صورت $[x_1, x_p]$ باشد، با توجه به جابجایی‌های مربوطه:
- دامنه‌ی توابع $f(x-a)$ و $f(x+a)$ به ترتیب $[x_1+a, x_p+a]$ و $[x_1-a, x_p-a]$ هستند.
- دامنه‌ی $f(kx)$ برابر $[\frac{x_1}{k}, \frac{x_p}{k}]$ است. (اگر k منفی باشد: $[\frac{x_p}{k}, \frac{x_1}{k}]$.)


مثال: درستی یا نادرستی هر مورد را معلوم کنید.

الف) اگر دامنه‌ی تابع f بازه‌ی $[-4, 1]$ باشد، دامنه‌ی تابع $y = -2f(\frac{x}{2})$ برابر $[-2, \frac{1}{2}]$ است.

ب) برای رسم نمودار تابع $y = |2x - 1|$ توسط نمودار $y = |x - 1|$ ، کافی است طول هر نقطه از نمودار تابع دوم بر عدد ۲ تقسیم شود.



نهایی؛ خرداد ۱۴۰۴



نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است. اگر تابع $g(x) = 3f\left(\frac{1}{3}x\right) + 1$ باشد، آنگاه:

الف) دامنه و برد تابع g را به صورت بازه بنویسید.

ب) اگر $A = (-2, 1)$ یک نقطه از نمودار تابع f باشد، آنگاه نقطه‌ی متناظر A روی نمودار تابع g را بنویسید.

پاسخ

؟ پاسخ دهید (۲)

۱- نمودار توابع زیر را به کمک نمودار تابع $y = \cos x$ رسم کنید.

الف) $y = \cos 2x - 1$ ب) $y = 2 \cos\left(\frac{x}{3}\right)$

۲- نمودار تابع $y = -\sqrt{-x}$ را رسم کرده و دامنه و برد آن را تعیین کنید.

منتخب کتاب:


۱- نمودار تابع f به صورت مقابل است:

نمودار توابع زیر را رسم کرده و با نمودار f مقایسه کنید.

$$y = f(-x)$$

$$y = -f(x)$$

$$y = -f(-x)$$




۲- نمودار تابع f به صورت مقابل است:

نمودار توابع زیر را رسم کنید.

$$y = f(-x) + 2$$

$$y = f(3-x)$$

$$y = f(2x-1)$$




توجه فرمایید:


اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



۳- نمودار زیر فقط از قرینه‌یابی و انتقال نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ حاصل شده؛ ضابطه‌ی آن را بنویسید.



چالش (ویژه علاقمندان)



نمودار مقابل مربوط به تابع $f(2x+1)$ بوده و دامنه‌ی تابع $\sqrt{\frac{1-x^2}{f(x)}}$ برابر $[a, b) - \{c\}$ است. حاصل $b - a + c$ را بیابید.



۳

توابع چند جمله‌ای

شکل کلی تابع چند جمله‌ای:

$$f(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + kx + l$$

که ضرایب $a \neq 0, b, \dots, k, l$ عددهایی حقیقی و $n \geq 0$ (بیشترین توان x) عددی صحیح و درجه‌ی چند جمله‌ای است. چند حالت ویژه از این توابع:

• **تابع ثابت:**

ساده‌ترین تابع به صورت $f(x) = c$ چند جمله‌ای درجه‌ی صفر است. (c عدد ثابت)

• **تابع قطبی:**

تابع به صورت $f(x) = ax + b$ چند جمله‌ای درجه‌ی یک می‌باشد.

• **تابع درجه دوم:**

این تابع به صورت $f(x) = ax^2 + bx + c$ است، نمودارش همیشه یک سهمی است که در پایه یازدهم بررسی گردید.

• **تابع درجه سوم:**

به صورت کلی $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ است. بررسی بیشتری از آن در ادامه‌ی این درس انجام خواهد شد.

🌟 **مثال:** درجه‌ی تابع $f(x) = x^2(1-x)^5$ را مشخص کنید.

پاسخ ✓

🌟 **مثال:** در یک تابع خطی f ، رابطه‌ی $f(x+2) = f(x) + 2$ برقرار بوده و $f(2) = 5$ است. مقدار $f(-1)$ را حساب کنید.

پاسخ ✓

🌟 **مثال:** ابتدا نمودار دو تابع $f(x) = x^2$ و $g(x) = x^3$ را رسم کنید و سپس توسط نمودار، مجموعه جواب نامعادله‌های $f(x) > g(x)$ و $g(x) \geq f(x)$ را مشخص کنید.

پاسخ ✓


نهایی؛ خرداد ۱۳۹۹

نمودار تابع $g(x) = x^3$ در فاصله‌ی $[0, 1]$ پایین‌تر از نمودار تابع $f(x) = x^2$ قرار دارد. (درست □ - نادرست □)

مثال: با توجه به نمودار $y = x^3$ ؛

الف) هنگام رسم نمودار $f(x) = -x^3$ ، نمودار تابع فوق نسبت به محور طول قرینه می‌شود.

ب) برای رسم نمودار $g(x) = -x^3 - 1$ ، نمودار f یک واحد به پایین منتقل می‌شود.



مثال: (از کتاب) نمودار تابع $y = x^3 - 3x^2 + 3x$ را رسم کنید.

پاسخ ✓

مثال: فقط مراحل رسم نمودار تابع $y = -(x-1)^3 + 3$ توسط نمودار $y = x^3$ را بیان کنید.

پاسخ ✓

مثال: (از کتاب) با توجه به نمودار $f(x) = x^3$ ، نشان دهید این تابع وارون‌پذیر است. سپس، نمودار f^{-1} را رسم کرده و


ضابطه‌ی تابع وارون را تعیین کنید.

پاسخ ✓



نتیجه:

طبق آنچه در مثال قبل دیدیم، تابع $y = \sqrt[3]{x}$ با دامنه و برد \mathbb{R} ، نموداری به صورت زیر دارد:



نهایی؛ خرداد ۱۴۰۳

تابع $f(x) = (x-2)^3 + 1$ را در نظر بگیرید؛ نمودار f^{-1} از ناحیه محورهای مختصات عبور نمی کند.

جواب:

پاسخ دهید (۳) ?

۱- نمودار تابع $y = 2 - x^3$ را به کمک نمودار $f(x) = x^3$ رسم کنید.

۲- اگر $f(x) = x^3$ باشد، با رسم نشان دهید نمودارهای دو تابع $y = f(x-1)$ و $y = f(x) - 1$ در دو نقطه مشترک هستند.

ملفب کتاب:

۱- تابع $f(x) = (x-2)^3 + 1$ داده شده است.


الف) نمودار تابع f را رسم کنید.

ب) نشان دهید این تابع وارون پذیر است و نمودار f^{-1} را رسم کنید.

پ) ضابطه‌ی تابع وارون را به دست آورید.



چالش (ویژه علاقمندان)



شکل روبه‌رو نمودار تابع $f(x) = -4\alpha - (x-\alpha)^3$ است. کمترین مقدار

k را چنان تعیین کنید تا نمودار تابع $g(x) = (x+2\alpha)^3 + k$ از ناحیه‌ی

چهارم عبور نکند.



توابع یکنوا

۱۴


فرض کنید تابع f روی مجموعه A تعریف شده باشد و $x_1, x_2 \in A$:

❖ f را روی A «صعودی» گوئیم، هرگاه اگر $x_1 < x_2$ باشد، آنگاه $f(x_1) \leq f(x_2)$. یعنی:


با زیاد شدن x ، مقدار تابع یا ثابت بماند و یا زیاد شود.

❖ f را روی A «نزولی» گوئیم، هرگاه اگر $x_1 < x_2$ باشد، آنگاه $f(x_1) \geq f(x_2)$. یعنی:

با زیاد شدن x ، مقدار تابع یا ثابت بماند و یا کم شود.



تابع صعودی



تابع نزولی

بنابراین:


در تابع صعودی، با حرکت از چپ به راست روی نمودار، هیچ‌گاه رو به پایین نخواهیم رفت. (به همین شکل، تابع نزولی را توصیف کنید).

❖ تابع f را روی A «اکیداً صعودی» گوئیم، هرگاه اگر $x_1 < x_2$ باشد، آنگاه $f(x_1) < f(x_2)$. یعنی:


با زیاد شدن x ، مقدار تابع الزاماً زیاد شود.

❖ تابع f را روی A «اکیداً نزولی» گوئیم، هرگاه اگر $x_1 < x_2$ باشد، آنگاه $f(x_1) > f(x_2)$. یعنی:

با زیاد شدن x ، مقدار تابع الزاماً کم شود.



تابع اکیداً صعودی



تابع اکیداً نزولی

بنابراین:

با حرکت از چپ به راست روی نمودار یک تابع اکیداً نزولی، همواره رو به پایین خواهیم رفت. (به همین شکل، یک تابع اکیداً صعودی را توصیف کنید).

نام‌گذاری:

تابع صعودی یا نزولی را «یکنوا» و تابع اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی را «اکیداً یکنوا» گوئیم.

توجه کنید:

طبق تعریف، تابع اکیداً صعودی، صعودی هم هست و تابع اکیداً نزولی، نزولی هم محسوب می‌شود.

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



مثال: تابع ثابت $f(x) = k$ روی \mathbb{R} شرط صعودی بودن را دارد، زیرا $f(x_1) \leq f(x_2)$ همان $k \leq k$ بوده که برقرار است. واضح است که تابع ثابت، نزولی هم هست. بنابراین:
تابع ثابت هم صعودی و هم نزولی است؛ ولی اکیداً یکنوا نیست.

نهایی؛ خرداد ۱۳۹۹

اگر تابع $f(x)$ در یک فاصله صعودی باشد، آنگاه اکیداً صعودی هم خواهد بود. (درست - نادرست)

مثال: با رسم، یکنوایی توابع $y = x^3$ ، $y = x|x|$ ، $y = |x| + x$ و $y = [x]$ را روی \mathbb{R} بررسی کنید.

پاسخ

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۴

تابع $f(x) = (1-x)^3$ تابعی اکیداً نزولی است. (درست - نادرست)

جواب:

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۲

نمودار تابع $g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ را به کمک نمودار $f(x) = x^3$ رسم کنید، سپس یکنوایی اکید تابع $g(x)$ را در تمام دامنه‌ی خود بررسی کنید.

پاسخ

توجه کنید:

چنان که در نمونه‌های قبل هم دیدیم، گاهی تابع روی تمام دامنه‌ی خود یکنوا نیست؛ اما می‌توان دامنه‌ی آن را طوری محدود کرد، تا در آن دامنه یکنوا باشد. نمونه‌ی دیگر:



توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



تابع $y = x^2$ روی \mathbb{R} یکنوا نیست، ولی:

- روی بازه $[0, \infty)$ اکیداً صعودی است.
- روی بازه $(-\infty, 0]$ اکیداً نزولی است.



مثال: درستی یا نادرستی هر مورد را معلوم کنید:

الف) تابع $y = -x^3$ در بازه $(-\infty, 0)$ صعودی است.

ب) تابع $y = |x|$ در بازه $[-3, 0]$ اکیداً نزولی است.

پ) تابع $y = \sqrt{x}$ در دامنه‌اش اکیداً نزولی است.

مثال: تابع $h(x) = |x+2|$ در چه بازه‌ای اکیداً صعودی است؟

پاسخ

مثال: محدوده‌ی x را طوری تعیین کنید که تابع $y = 2x - x^2$ در آن محدوده نزولی باشد.

پاسخ

مثال: نمودار توابع $f(x) = -\frac{1}{x}$ و $g(x) = x - |x|$ را رسم کرده و فواصل یکنوایی هر یک را مشخص کنید.

پاسخ

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



نهایی؛ خرداد ۱۴۰۰

با رسم نمودار تابع $y = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -3x & -1 < x < 0 \end{cases}$ تعیین کنید تابع در چه بازه‌ای اکیداً صعودی و در چه بازه‌ای اکیداً نزولی است.

پاسخ

وقتی ضابطه شامل چند قدر مطلق است، برای رسم، ضابطه را باز کنید.

مثال: نمودار تابع $y = |x+2| + |x|$ را رسم کرده و محدوده‌ای را مشخص کنید که تابع در آن صعودی است.

پاسخ

کاربرد:

از یکنوایی تابع می‌توان در حل برخی نامعادلات کمک گرفت.

❖ اگر تابع f اکیداً صعودی باشد:

$$f(a) \leq f(b) \Rightarrow a \leq b$$

❖ اگر تابع f اکیداً نزولی باشد:

$$f(a) \leq f(b) \Rightarrow a \geq b$$

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.



یادآوری:

هر دو تابع نمایی $y = a^x$ و لگاریتمی $y = \log_a x$ در حالت $a > 1$ اکیداً صعودی و در حالت $0 < a < 1$ اکیداً نزولی هستند. (البته: دامنه‌ی تابع نمایی \mathbb{R} و دامنه‌ی تابع لگاریتمی $(0, +\infty)$ است.)

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۲

اگر $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} \leq \frac{1}{125}$ باشد، حدود x را بیابید.

پاسخ

مثال: اگر $\log(x+1) \leq \log(2x-3)$ ، حدود x را به دست آورید.

پاسخ

پاسخ دهید (۱۴) ?

۱- ابتدا نمودار تابع $f(x) = x^2 + 2x$ را رسم کرده و سپس تعیین کنید این تابع در چه بازه‌ای اکیداً صعودی و در چه بازه‌ای اکیداً نزولی است؟ (نهایی؛ خرداد ۱۴۰۱)

۲- نمودار توابع $f(x) = 2^{-x}$ و $g(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$ را رسم کرده و یکنوایی هر یک را مشخص کنید.

۳- فرض کنید توابع f و g در یک فاصله اکیداً صعودی باشند.

الف) نشان دهید $f + g$ نیز در این فاصله اکیداً صعودی است.

ب) نشان دهید $y = kf(x)$ با شرط $k > 0$ اکیداً صعودی و با شرط $k < 0$ اکیداً نزولی است.

پ) در مورد تابع $f - g$ چه می‌توان گفت؟


(موارد بالا به طور مشابه در مورد مفهوم اکیداً نزولی هم برقرار هستند. قسمت الف)، سؤال نهایی خرداد ۴۰۳)

۴- نامعادله $(\sqrt{3}+1)^{2x} < (\sqrt{3}+1)^{x^2-2x}$ را حل کنید.



منتخب کتاب:

۱- نمودار توابع f ، g و h داده شده‌اند:



- الف) تابع f در چه فاصله‌هایی اکیداً صعودی و در چه فاصله‌هایی صعودی است؟
 ب) تابع g در چه فاصله‌هایی اکیداً نزولی و در چه فاصله‌هایی نزولی است؟
 پ) تابع h در چه فاصله‌هایی اکیداً نزولی است؟

۲- نمودار توابع $f(x) = \sqrt{2-x}$ و $g(x) = \log_p x$ را رسم کرده و یکنوایی هر یک را مشخص کنید.

۳- الف) آیا تابعی وجود دارد که در یک فاصله، هم صعودی باشد و هم نزولی؟
 ب) نمودار تابعی را رسم کنید که در هر یک از بازه‌های $(-\infty, 0)$ و $[0, +\infty)$ اکیداً صعودی باشد، ولی در \mathbb{R} اکیداً صعودی نباشد.

۴- الف) فرض کنید تابع f در یک بازه اکیداً نزولی بوده و a و b متعلق به این بازه باشند.
 اگر $f(a) \leq f(b)$ ، نشان دهید: $a \geq b$.

ب) اگر $\frac{1}{64} \leq \left(\frac{1}{p}\right)^{3x-2}$ ، حدود x را بیابید.



چالش (ویژه علاقمندان)

تابع با ضابطه‌ی $f(x) = \sqrt{x} - \sqrt{-2x+6} + 2$ را در نظر گرفته و دامنه‌ی تابع $y = \sqrt{f(x) - f^{-1}(x)}$ را مشخص کنید.



تقسیم چند جمله‌ای‌ها

در این بخش، تقسیم چند جمله‌ای‌ها و تجزیه‌ی برخی عبارات، در حد نیازهای ادامه‌ی این درس طرح و بررسی می‌شود.

مثال: تقسیم $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 5$ بر $x + 2$ را ببینید.

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - 4x - 5 \quad | \quad x + 2 \\ -(x^3 + 2x^2) \quad \quad \quad x^2 - 4 \\ \hline - 4x - 5 \\ - (-4x - 8) \\ \hline + 3 \end{array}$$

در نتیجه:

خارج قسمت تقسیم $x^2 - 4$ و باقی‌مانده عدد ۳ حاصل گردید و چند جمله‌ای $x^3 + 2x^2 - 4x - 5$ برابر عبارت زیر است:

$$(x+2)(x^2-4)+3$$

توجه کنید:

هر وقت بخواهید مانند بالا، تقسیم را انجام داده و خارج قسمت را مشخص کنید، باید ابتدا مقسوم و مقسوم علیه را از توان بزرگ به کوچک مرتب کنید. (البته، تعیین باقی‌مانده بدون انجام تقسیم را در ادامه خواهیم دید.)

قضیه تقسیم:

در تقسیم چند جمله‌ای $f(x)$ بر چند جمله‌ای $p(x)$ همواره:

دو چند جمله‌ای یکتای $q(x)$ و $r(x)$ یافت می‌شوند که:

$$f(x) = p(x)q(x) + r(x)$$

اولاً: تساوی مقابل برقرار باشد:

ثانیاً: درجه‌ی $r(x)$ از درجه‌ی $p(x)$ کوچک‌تر باشد.

$q(x)$ خارج قسمت و $r(x)$ باقی مانده‌ی تقسیم است.

بررسی یک خاصیت:

درمثال قبل، اگر ریشه‌ی مقسوم علیه، یعنی:

$$x + 2 = 0 \rightarrow x = -2$$

در عبارت $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 5$ (یعنی: مقسوم) قرار گیرد، می‌بینید باقی‌مانده به دست می‌آید:

$$f(-2) = (-2)^3 + 2(-2)^2 - 4(-2) - 5 = -8 + 8 + 8 - 5 = 3$$

روش سریع تعیین باقی‌مانده‌ی تقسیم مانند بالا است.

باقی‌مانده و بخش‌پذیری:

باقی‌مانده‌ی تقسیم $f(x)$ بر $x - a$ عبارت است از $R = f(a)$. بنابراین:

عبارت $f(x)$ بر $x - a$ بخش‌پذیر است، هرگاه $f(a) = 0$ باشد.

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.

**دلیل:**

اگر $Q(x)$ خارج قسمت و R باقی مانده‌ی تقسیم $f(x)$ بر $x-a$ باشند، خواهیم داشت:

$$f(x) = (x-a)Q(x) + R \xrightarrow{x=a} f(a) = \underbrace{0 \times Q(a)}_{=0} + R$$

توجه کنید:

حتی اگر مقسوم علیه به صورت $ax+b$ باشد، تعیین باقی مانده و شرط بخش پذیری مانند بالاست. ریشه را تعیین می‌کنیم:

$$ax+b=0 \Rightarrow x=-\frac{b}{a}$$

باقی مانده $f(-\frac{b}{a})$ است و در نتیجه:

$$f(x) \text{ بر } ax+b \text{ بخش پذیر است، هرگاه } f(-\frac{b}{a})=0 \text{ باشد.}$$

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۱

باقی مانده‌ی تقسیم چند جمله‌ای $p(x) = 8x^3 - 4x^2 + 2$ بر $2x+1$ را حساب کنید.

پاسخ

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۰

باقی مانده‌های تقسیم عبارت‌های $P(x) = x^3 + ax + 1$ و $Q(x) = 2x^2 - x + 1$ بر $(x+2)$ یکسان است. مقدار a را بیابید.

پاسخ

نهایی؛ خرداد ۱۴۰۳

اگر چند جمله‌ای $f(x) = x^3 + ax + 2$ بر $x-2$ بخش پذیر باشد، باقی مانده‌ی تقسیم $f(x)$ بر $x+1$ را حساب کنید.

پاسخ



مثال: باقی مانده‌ی تقسیم $p(x) = x^y - 3x^4 + ax - 1$ بر $x - 1$ ، برابر ۲ و خارج قسمت آن $q(x)$ است. مقدار $q(-1)$ را تعیین کنید.

پاسخ

اطلاع از بخش‌پذیری $P(x)$ بر یک عبارت، به یک مرحله تجزیه‌ی آن منجر می‌شود.

روشی برای تجزیه:

اگر عبارت $P(x)$ بر یک عبارت $Q(x)$ بخش‌پذیر باشد، خواهیم داشت:

$$P(x) = Q(x) \cdot A(x)$$

پس $P(x)$ یک مرحله تجزیه می‌شود.

$$\begin{array}{r|l} P(x) & Q(x) \\ \vdots & A(x) \\ \hline & 0 \end{array}$$

توجه کنید:

اگر عبارت‌های $Q(x)$ یا $A(x)$ قابل تجزیه باشند، با ادامه، تجزیه‌ی بهتری برای $P(x)$ به دست خواهد آمد.

برای نمونه؛

در عبارت $f(x) = x^3 - 3x - 2$ داریم: $f(2) = 0$. بنابراین $f(x)$ بر $x - 2$ بخش‌پذیر است و با تقسیم آن بر $x - 2$ تجزیه می‌شود:

$$x^3 - 3x - 2 = (x - 2)(x^2 + 2x + 1) \rightarrow x^3 - 3x - 2 = (x - 2)(x + 1)^2$$

مثال: اگر یکی از جواب‌های معادله‌ی $2x^3 + x^2 + mx - 4 = 0$ برابر $x = -2$ باشد،

الف) مقدار m را بیابید.

ب) سایر جواب‌های معادله را مشخص کنید.



در پایان این بخش، تقسیم عبارت‌های $x^n \pm a^n$ بر $x \pm a$ و تجزیه‌ی آن بررسی می‌شود.

به اتحادهای زیر نگاه کنید:

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \quad \text{و} \quad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

واضح است که عبارت $x^n - a^n$ همواره بر $x - a$ بخش‌پذیر، یعنی باقی‌مانده‌ی تقسیم برابر صفر است. (چرا؟! ضمناً با تقسیم، خارج قسمت تعیین شده و تجزیه‌ی عبارت $x^n - a^n$ به دست می‌آید:

$$x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + xa^{n-2} + a^{n-1})$$

برای نمونه:

$$a^5 - b^5 = (a-b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4)$$

$$x^6 - 6^6 = x^6 - 2^6 = (x-2)(x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 16x + 32)$$

برخی نتایج:

▪ در حالت خاص وقتی $a=1$ باشد، داریم:

$$x^n - 1 = (x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)$$

$$n \in \mathbb{N}$$

برای نمونه:

$$x^5 - 1 = (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \quad (\text{نهایی؛ خرداد ۱۴۰۳})$$

در دو حالت بعد، زوج یا فرد بودن n لازم است:

▪ **اگر n فرد باشد؛** و در تجزیه‌ی $x^n - a^n$ ، جمله‌ی $-a$ را جایگزین a کنیم، داریم:

$$x^n - (-a)^n = (x - (-a))(x^{n-1} + x^{n-2}(-a) + \dots + x(-a)^{n-2} + (-a)^{n-1})$$

با ساده سازی، تجزیه‌ی $x^n + a^n$ حاصل شده و بر $x+a$ بخش‌پذیر است:

$$x^n + a^n = (x+a)(x^{n-1} - x^{n-2}a + \dots - xa^{n-2} + a^{n-1})$$

در پراتز سمت راست تعداد جملات n تا و علامت‌ها یک در میان مثبت و منفی هستند.

برای نمونه:

$$a^5 + b^5 = (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$$

▪ **اگر n زوج باشد؛** و در تجزیه‌ی $x^n - a^n$ ، جمله‌ی $-a$ را جایگزین a کنیم، داریم:

$$x^n - (-a)^n = (x - (-a))(x^{n-1} + x^{n-2}(-a) + \dots + x(-a)^{n-2} + (-a)^{n-1})$$

با ساده سازی، تجزیه‌ی $x^n - a^n$ بر حسب عامل $x+a$ حاصل می‌شود:

$$x^n - a^n = (x+a)(x^{n-1} - x^{n-2}a + \dots + xa^{n-2} - a^{n-1})$$

در پراتز سمت راست تعداد جملات n تا و علامت‌ها یک در میان مثبت و منفی هستند.

برای نمونه:

$$a^4 - b^4 = (a+b)(a^3 - a^2b + ab^2 - b^3)$$

توجه فرمایید:

اطلاعات و تبلیغ مدرس یا آموزشگاه روی جلد و تمام اطراف این صفحه قابل درج است.

جمع بندی:

الف) عبارت $x^n - a^n$ همواره بر $x - a$ بخش پذیر است و بر $x + a$ فقط با شرط **زوج** بودن n بخش پذیر خواهد بود.
ب) عبارت $x^n + a^n$ فقط با شرط **فرد** بودن n بر $x + a$ بخش پذیر است.

بعلاوه:

عبارت $x^n + a^n$ هیچ گاه بر $x - a$ بخش پذیر نیست و بر حسب عامل $x - a$ تجزیه نمی شود. (چرا؟)

مثال: چند جمله ای $x^6 - 1$ را بر حسب عامل های زیر تجزیه کنید.

الف) $x - 1$ ب) $x + 1$



پاسخ دهید (۵)

۱- اگر چند جمله ای $x^2 + ax - 8$ بر $x - a$ بخش پذیر باشد، مقدار a را تعیین کنید. (نهایی؛ خرداد ۱۴۰۲)

۲- مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که چند جمله ای $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ بر $x - 2$ و $x + 1$ بخش پذیر باشد.

۳- مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که چند جمله ای $P(x) = 2x^3 + ax^2 - bx + 2$ بر $x + 2$ بخش پذیر بوده و باقی مانده ی تقسیم آن بر $x - 1$ برابر ۲ باشد. (نهایی؛ فرورداد ۱۴۰۴)

منتفب کتاب:

۱- هر یک از چند جمله ای های زیر را بر حسب عامل خواسته شده تجزیه کنید.

الف) $x^6 - 1$ با عامل $x - 1$.

ب) $x^6 - 1$ با عامل $x + 1$.

پ) $x^5 + 32$ با عامل $x + 2$.



چالش (ویژه علاقمندان)

باقی مانده ی تقسیم $P(x)$ بر x^2 برابر $x - 3$ است. باقی مانده ی تقسیم $P^2(x)$ بر x^2 را تعیین کنید.

لیست کامل مجموعه‌های آموزشی

ریاضی تیزهوشان	متوسطه اول (عادی)	دوره ابتدایی (عادی)
ریاضی تیزهوشان ششم	جزوه ریاضی هفتم	جزوه ریاضی پنجم
ریاضی تیزهوشان هفتم	جزوه ریاضی هشتم	جزوه ریاضی ششم
ریاضی تیزهوشان هشتم	جزوه ریاضی نهم	
ریاضی تیزهوشان نهم		

استعداد تحلیلی (ششم به هفتم)	استعداد تحلیلی (نهم به دهم)
جزوه هوش کلامی (ادبی)	جزوه هوش غیرکلامی (تصویری)
جزوه هوش غیرکلامی (تصویری)	جزوه هوش ریاضی و محاسبات
جزوه هوش ریاضی - منطقی و سرعتی	جزوه هوش منطقی و استدلال (شامل تحلیل متن)

متوسطه دوم (تجربی: کنگوری)	متوسطه دوم (تجربی: تشریحی)
جزوه کنکور ریاضی دهم	جزوه تشریحی ریاضی دهم
جزوه کنکور ریاضی یازدهم	جزوه تشریحی ریاضی یازدهم
جزوه کنکور ریاضی دوازدهم	جزوه تشریحی ریاضی دوازدهم
جزوه جامع کنکور تجربی	

متوسطه دوم (ریاضی: کنگوری)	متوسطه دوم (ریاضی: تشریحی)
جزوه کنکور ریاضی دهم	جزوه تشریحی ریاضی دهم
جزوه کنکور مسابان (۱)	جزوه تشریحی هندسه (۱)
جزوه کنکور آمار و احتمال	جزوه تشریحی هندسه (۲)
جزوه کنکور هندسه (۲)	جزوه تشریحی مسابان (۱)
جزوه کنکور مسابان (۲)	جزوه تشریحی آمار و احتمال
جزوه کنکور ریاضیات گسسته	جزوه تشریحی ریاضیات گسسته
جزوه کنکور هندسه (۳)	جزوه تشریحی هندسه (۳)
جزوه جامع کنکور ریاضی	جزوه تشریحی مسابان (۲)

رشته انسانی
جزوه ریاضی و آمار پایه دهم (تشریحی + کنکور در یک مجموعه، البته تفکیک شده)
جزوه ریاضی و آمار پایه یازدهم (تشریحی + کنکور در یک مجموعه، البته تفکیک شده)
جزوه ریاضی و آمار پایه دوازدهم (تشریحی + کنکور در یک مجموعه، البته تفکیک شده)

ما متمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش هستیم.

سپاس از توجهتان



۰۹۳۵ ۶۰۰ ۸۴۵۴
 ۰۹۲۰ ۶۰۰ ۸۴۵۴